

De nombreuses espèces d'Afrique, actuellement en danger ou menacées par le commerce de la viande de brousse, sont en voie d'extinction. C'est le cas par exemple du pangolin géant et des grands singes. Des espèces autrefois très répandues sont devenues rares et ont déjà disparu de certaines régions.

Facteurs contribuant à la mise en danger d'une espèce par

la chasse commerciale:

- réduction de l'habitat
- habitat situé à proximité d'agglomérations urbaines
- petites populations
- poids supérieur à 4 kg
- taux de reproduction très lent
- progéniture peu nombreuse
- phase de développement longue
- concentration sur certains espaces vitaux/sources d'alimentation
- absence de structure sociale, densité de population faible
- activité diurne
- vie au sol
- comportement repérable (bruyant, par exemple) et déplacement très lent


Les espèces de grande taille ou facilement repérables sont les premières victimes. **La plupart sont des ongulés et des rongeurs.** En Guinée-Équatoriale, les rongeurs représentent 32% de l'offre; au Liberia, les céphalophes constituent 75% du gibier vendu.



Céphalophe à front noir pris dans un collet.

I. Wachs

Les céphalophes (antilopes de forêt) paient un des plus lourds tributs au commerce du gibier. Ils sont généralement capturés à l'aide de collets ou de filets. On estime que leur population reste stable en dépit de la chasse intensive dont ils font l'objet, ce qui ne signifie pas pour autant que les méthodes actuelles perdureront. **En Guinée-Équatoriale, le nombre de céphalophes d'Ogilby abattus est deux fois supérieur au taux acceptable, au Cameroun, il est onze à treize fois supérieur.** Le nombre de céphalophes bai abattus ici est également 9 fois supérieur à ce qui serait possible à long terme. Le céphalophe bleu, qui vit en couple, est devenu très rare.



Famille d'okapis


W. Reizenet

Les **okapis** ne figurent pas parmi les principales victimes du commerce de gibier, pourtant, **leur population de 6 000 à 10 000 individus seulement ne peut résister à une chasse intensive.** Les okapis vivent principalement dans la forêt d'Ituri, au nord-est de la RD Congo, où fut créée en 1992 une réserve naturelle d'okapis sur 13 000 km². Au milieu des années 90, celle-ci fut classée patrimoine naturel mondial par l'IUCN. Depuis que la guerre a éclaté en RD Congo, la viande et la fourrure d'okapis ont fait une forte apparition sur les marchés.




Léopard

W. Reizenet



Colobe guéréza

K. Lechner



Bongo

M. Rothbauer



Hippopotame

I. Wachs

Les **hippopotames** font partie des cibles préférées pour le commerce du gibier. Dans certaines régions, ils menacent de s'éteindre. **Entre 1990 et 1997 dans la seule région du nord du Parc de Virunga (RDC), 7 500 individus (75% de la réserve locale) ont été abattus pour leur viande.**

Chimpanzés
 Bonobo
 Gorille
 Drill
 Mandrill
 Cercopithèque de Preuss
 Cercopithèque de sclater
 Cercopithèque à queue de soleil
 Cercopithèque à tête de hibou
 Cercopithèque de brazza
 Cercopithèque hocheur
 Cercopithèque pogonias
 Cercopithèque de Diane
 Moustac à oreilles rousses
 Cercopithèque à ventre rouge
 Moustac
 Guéréza noir
 Colobe Guéréza
 Mangabey à joues grises
 Colobe ferrugineux
 Éléphant de forêt d'Afrique
 Hippopotame
 Okapi
 Buffle d'Afrique
 Céphalophe zébré
 Céphalophe d'Ogilby
 Céphalophe noir
 Céphalophe bai
 Céphalophe à front noir
 Céphalophe de Jentink
 Céphalophe bleu
 Céphalophe à dos jaune
 Céphalophe à ventre blanc
 Céphalophe de Peters
 Bongo
 Sitatunga
 Tragulidé
 Potamochère
 Hylochère
 Léopard
 Chat doré
 Civette
 Pangolin géant
 Crocodile nain